

TRACIVET 20%

Solución inyectable

FÓRMULA:

Clorhidrato de oxitetraciclina	100 mg
Vehículo c.s.p.	1 ml

INDICACIONES:

Indicado en **bovinos, ovinos y porcinos** para el tratamiento de infecciones bacterianas como **anaplasmosis, neumonías, metritis, mastitis, diarreas, leptospirosis y pododermatitis**, así como procesos **postparto, abscesos e infecciones por anaerobios**.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Antibiótico de amplio espectro, activo contra bacterias Gram positivas y Gram negativas, rickettsias y micoplasmas. Actúa inhibiendo la síntesis proteica a nivel de la subunidad ribosomal 30S, impidiendo la reproducción bacteriana.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos

PRESENTACIONES:

Frascos conteniendo 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Solución inyectable

PERÍODO DE RETIRO:

Carne: 28 días después del último tratamiento.

Leche: 7 días después del último tratamiento.

USO EN HEMBRAS GESTANTES:

No administrar durante los últimos dos tercios de la gestación, salvo criterio profesional.

DOSIFICACIÓN (POSOLOGÍA / REFERENCIA TÉCNICA)

10–20 mg/kg ($\approx$ 1–2 ml/10 kg PV) cada 24 h por 3–5 días según gravedad.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa, entre 15°C y 30°C.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:



- No administrar en animales con hipersensibilidad a las tetraciclinas.
- No mezclar en la misma jeringa con otras sustancias.
- Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Desechar el envase y residuos conforme a la normativa ambiental vigente.
- **Mantener fuera del alcance de los niños**



YALE HEALTHCARE GROUP

Calle 50 Esq. Elvira Mendez
PH Tower Bank P35,

Centro Regus Ciudad de Panamá, PA
+507 6151-2856

www.yalehealthcaregroup.com