

PIRIVET

AINE (Dipirona sódica)

FÓRMULA:

Dipirona sódica	500 mg
Excipiente c.s.p.	1 ml

INDICACIONES:

Antiinflamatorio no esteroideo (**AINE**) con acción **analgésica, antipirética y antiespasmódica**. Indicado para el tratamiento y prevención de **dolor, fiebre e inflamación** en procesos agudos y crónicos como **cólicos, artritis, artrosis y cuadros postoperatorios**.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Derivado **pirazolónico** que actúa bloqueando la **síntesis de prostaglandinas y tromboxanos**, reduciendo inflamación, dolor y fiebre. Su efecto es **rápido (5-15 min)** tras la aplicación intramuscular y actúa tanto a nivel **periférico como central**.

PRESENTACIONES:

Frascos de 20, 50, 100 y 500 ml

ESPECIES DE DESTINO:

Equinos, bovinos, ovinos, caprinos y porcinos

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar por vía intramuscular (IM), subcutánea (SC) o intravenosa lenta (IV), según criterio veterinario. Repetir la dosis según evolución clínica, sin exceder el tratamiento de 3-5 días continuos.

PERÍODO DE RETIRO:

Carne: 4 días después del último tratamiento.

Leche: 3 días después del último tratamiento.

DOSIFICACIÓN (POSOLOGÍA / REFERENCIA TÉCNICA)

25-50 mg/kg ($\approx$ 0.05-0.1 ml/kg) cada 12-24 h según cuadro, dolor/ fiebre.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa, entre 15°C y 30°C.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:



- No administrar a animales con insuficiencia renal o hepática severa.
- No usar en animales con hipersensibilidad a la dipirona o pirazolonas.
- Evitar uso prolongado o combinado con otros analgésicos.
- Administrar lentamente por vía IV.
- Desechar conforme a la normativa ambiental vigente.
- **Mantener fuera del alcance de los niños.**



YALE HEALTHCARE GROUP

Calle 50 Esq. Elvira Mendez

PH Tower Bank P35,

Centro Regus Ciudad de Panamá, PA

+507 6151-2856

www.yalehealthcaregroup.com