

BIODEXAVET

Solución inyectable

FÓRMULA:

Dexametasona fosfato sódico	4 mg
Excipiente c.s.p.	1 ml

INDICACIONES:

Glucocorticoide de **amplio espectro**, indicado en **bovinos, porcinos y equinos** como **antiinflamatorio, antialérgico y coadyuvante** en casos de shock anafiláctico, fatiga e inflamaciones **músculo-esqueléticas** como artritis, bursitis y miositis.

MECANISMO DE ACCIÓN:

La **dexametasona** inhibe la **respuesta inflamatoria e inmune**, estabiliza las **membranas celulares** y estimula la **gluconeogénesis**, mejorando la disponibilidad energética y la **respuesta hematológica**.

PRESENTACIONES:

Frascos de 20, 100 ml

ESPECIES DE DESTINO:

Equinos, bovinos, ovinos, caprinos y porcinos

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar por vía intramuscular, intravenosa o subcutánea, según el criterio del médico veterinario. En casos severos, repetir la dosis cada 24–48 horas según evolución clínica.

PERÍODO DE RETIRO:

Carne: 8 días después del último tratamiento.

Leche: 3 días después del último tratamiento

DOSIFICACIÓN (POSOLOGÍA / REFERENCIA TÉCNICA)

0.05–0.2 mg/kg ($\approx$ 0.0125–0.05 ml/kg) cada 24 h por 1–3 días según especie y severidad; 1–3 días máx.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa, entre 15°C y 30°C.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

- No administrar en animales gestantes, salvo indicación para inducción del parto.
- No usar en infecciones virales, micóticas o parasitarias sin tratamiento antimicrobiano asociado.
- No administrar por periodos prolongados.
- No mezclar con otros medicamentos en la misma jeringa.
- Administrar bajo supervisión veterinaria.
- Desechar conforme a la normativa ambiental vigente.
- **Mantener fuera del alcance de los niños.**



YALE HEALTHCARE GROUP

Calle 50 Esq. Elvira Mendez
PH Tower Bank P35,
Centro Regus Ciudad de Panamá, PA
+507 6151-2856
www.yalehealthcaregroup.com